

CIRUGÍA DE LOS PÁRPADOS O BLEFAROPLASTÍA

La cirugía estética de los párpados o “Blefaroplastía” está indicada en hombres y mujeres que tienen un aspecto senil o cansado en la mirada, arrugas, bolsas de grasa y ojeras. En pacientes con exceso de piel que dificulta la apertura de los párpados superiores. En pacientes más jóvenes que desean modificar algunos rasgos hereditarios y en pacientes ya operados para mejorar o corregir los resultados previos. No corrige la inflamación de los párpados secundaria a alguna enfermedad subyacente como la hipertensión arterial descontrolada o enfermedades endocrinas.

Los objetivos de ésta cirugía son: restaurar el aspecto de los párpados, rejuvenecer la mirada, mejorar el campo visual y darle una apariencia más luminosa, descansada y sana a su cara sin alterar las características naturales de expresión de sus ojos.

Las técnicas de Blefaroplastía consisten en quitar el excedente de piel de los párpados superiores, remover piel y parte de las bolsas grasas para recolocarlas en su posición anatómica y corregir el abultamiento y el doble contorno de los párpados inferiores.

Las cicatrices quedan ocultas en los surcos de los párpados superiores y en el borde de las pestañas de los párpados inferiores.

En algunos casos para lograr mejores resultados deben considerarse otros procedimientos adicionales como: el levantamiento quirúrgico de cejas, la corrección de las “patas de gallo” con botox o peeling y el tratamiento de las ojeras. Se puede realizar junto con otros procedimientos quirúrgicos como Ritidectomía o “Lifting Facial”, Rinoplastia, Cirugía de Pómulos etc.

Si no se combina con otros procedimientos ésta cirugía se puede hacer en forma ambulatoria con anestesia local o bien agregando una sedación. Como cualquier procedimiento quirúrgico, implica un riesgo someterse a una cirugía y a los efectos de la anestesia.

Existe la posibilidad de que se pueda formar un hematoma, seroma, infección de la herida quirúrgica, sufrimiento de la piel, infección de tejidos blandos, reacciones eventuales a la anestesia, cicatrización anormal, lesión a estructuras nerviosas o musculares, dehiscencia de la herida, asimetría de la cicatriz.